

## **DEFOLIANTE PARA ALGODÓN**

Fitorregulador que se utiliza como defoliante en algodonero ya que induce la formación de una capa de abscisión entre el tallo de la planta y los peciolos de las hojas, provocando su caída. Proporciona mayor limpieza y calidad de la fibra a la vez que concentra la cosecha y mejora el rendimiento de la maquinaria.



Composición	Tidiazuron 50 % p/p (500 g/Kg)
Formulación	Polvo Mojable (WP)
R.O.P.M.F. n°	22.351
Envasado	900 g (3 x 300 g)
Clasificación	Nocivo (Xn) Peligroso para el Medio Ambiente (N) Mamíferos: A Aves: A Peces: A

## **DOSIS Y MODO DE EMPLEO**

Aplicar en pulverización normal, a una dosis de 300-400 g/ha en función de la densidad de vegetación y la temperatura ambiente (utilizar la dosis mayor con alta densidad de vegetación o cuando se prevean temperaturas bajas).

En aplicaciones terrestres se aconseja utilizar 400 litros de caldo por ha, mientras que en aplicaciones aéreas son necesarios 50-100 litros de caldo por ha.

separate debe aplicarse cuando exista un 80-85% de cápsulas ya maduras, aunque no abiertas, es decir unos 55-65 días después de la fecha de máxima floración.

## **PRECAUCIONES**

Durante la aplicación se deberá evitar la deriva del producto a cultivos vecinos en los que podría causar defoliación u otros daños.

No plantar cereales, maíz o cultivos de raíz o tubérculo, antes de pasadas dos semanas de la aplicación de separate. El plazo de espera para la siembra de legumbres, alfalfa o cultivos hortícolas de hoja, es de 2 meses después de la aplicación de separate.

Una vez aplicado el producto, se recomienda limpiar a fondo todo el equipo de aplicación con un detergente apropiado, asegurándose de que queden perfectamente limpios todos los elementos.